


עבד אבא פאר אן עקסלענטען שטייגער פאר אן אידעאלען אידעאלען
אידעאלען, אידעאלען אידעאלען אידעאלען.

Min-Cut

הוכחה: נניח v_1, v_2 הם קצוות של G .
 כך נראה שהם הם v_1, v_2 .

(Karger, 94) הבלאז'ן

5. 308 ע' 201 2-1 פ"נ3 פ"נ2, 201 2-1 פ"נ3




המשלה היא הביטחון של קונקורדיה 'קונקורדיה'
ועליו הם אמרו שיהיה (יו) גם קטן בעליו (אז)

במחלק האמריקני אומרו לך פולאטא נך

הן הם יצאו מהם והם יצאו מהם

המיון הרביעי נקרא אסל-כרס או ע

רצון ה' יב



המלצא ג'ר דמך שאלו האמסר ^{בן המר} הקדמ ~~המלצא~~ בן הקדמור'ל.

נראה כי זאת היא הסיבה לכך שיש הרבה יותר קטנים

Es ist also eine Art zu haben.

שירותי, וינסתמשו על האדמה בלוי חקלאים מאיזון קציר.

על כוללן, כל כוללן קר ליהל כוללן, כל כוללן קר ליהל כוללן

על מ'ה ה'חזק C מכיון ששני ה' קובצים אליו בקבוצה אחת כאלו

(שכילוב קא שפ"ה בתר).

~~הערה~~ היתר החרש לרשום את כל המידע

הם יתנו לנו את המידע הזה

W/o fcp 18

8, ב' 303 ד'תקל"א ע' התק' וכן התק' ק'י"א ב' ד'תקל"א ע' 4
ב' ד'תק' .

[illegible]

אם בלבד n ציורים, אז גם הקשת הכוללת היא לבנה.
 נחלק את n ל- 2 חלקים: n_1 ו- n_2 .
 אם n_1 הוא זוגי, אז n_1 הוא לבן.

$$1 - \frac{k}{|E|} \geq 1 - \frac{k}{\frac{kn}{2}} = 1 - \frac{2}{n}$$

Es ist die mittlere Rate für $\frac{(n-1)}{2}$ und es gilt:

$$1 - \frac{k}{\frac{k(n-1)}{2}} = 1 - \frac{2}{n-1}$$

כח/סן 13, הכשרות שהתקן שיש לו חלק ה-י האדמתי:

$$1 - \frac{2}{n-i+1} = \frac{n-i-1}{n-i+1}$$

הכנסת את ג יחד עם האותיות האחרות:

$$(1 - \frac{2}{n})(1 - \frac{2}{n-1}) \cdots (1 - \frac{2}{3}) = (\frac{n-2}{n})(\frac{n-3}{n-1})(\frac{n-4}{n-2}) \cdots (\frac{1}{3})$$

[illegible]

$$\frac{2}{n(n-1)} = \frac{1}{\binom{n}{2}}$$

ההסתברות היא $\frac{1}{2}$ קרוב γ או β היא $\frac{1}{2}$ הסתברות $(d\omega^2)$

נבדוק, איך $O(n^2 \log n)$ נראה, נבדוק

החזק הנשוא. ייחוסה. מקורה.

הערה: המילה "מחשבה" היא מילה נרדפת ל"חשיבה".

אם התורה חרבה כאלו ק' שנים יום יום וכל אדם חרבה

אן האלאנדאישע דעם יחזקא אקספונקטא'ל א ברודער (1880)

יש להוסיף את המסה של המוצק $\frac{1}{2}$ לנפח של המוצק

אני מעלה בכתב. יצרן שטח הכותה הוא שנת 1977.

ה'תשנ"ב, חודש שבט, יום ג' ט"ז

[illegible]

28.8.2020

לסקנה קומבינטורית

כל חתך שניתן לקבל באמצעות ברמסטרוב $\leq \frac{1}{\binom{n}{2}}$. בנוסף, האוסט

שבה בחינו ארבע שנים הם זרים (כל הרצף של האמצעים בחינו

חתך יחיד). עם מספר החברים האנטיגון האחד $\geq \binom{n}{2}$, וחס

כל הוא לא הצוק.